

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS DE LYMPHOME DE HODGKIN DANS SA FORME LOCALISEE AU CHU BLIDA

ABENBOURNAN

■ ■ ■

- Le lymphome de Hodgkin



- Le traitement
- chimiothérapie
- radiothérapie



- C'est une étude

d'hématologie du CHU BLIDA entre janvier 2019 et le 31 décembre 2024.

192 LH
d 68 (35%) à un stade localisé.

➤ Age moyen: 36 ans

(7 - 76)

➤ Sex-ratio = 0,7

♀

- 8 mois (1-36) type scléronodulaire 87%



- 67%
➤ Evaluation
INTERMEDIAIRE à 85%
TDM à 85%
l'évaluation FINALE à 55%
TEP à 55%


- RC à 45
67%
• Échec à 07 à 10%

Classification	Nombre de cas	Pourcentage
A	6	%
B	0	%
A	0	%
B	4	%

Un **Bulky** est retrouvé chez 18% des patients

➤ SCORE PONSTIQUE :
69% sont de pronostic **DEFAVORABLE** selon
B9CFH7.

- Tous les patients ont reçu de la chimiothérapie.
- Seulement 28% des patients ont reçu de la RT associée



- 31
Décembre 2024:
□ 02 à
➤ 60 à : Délai
➤ 05 à moyenne 23 mois (8-36 mois)
□ 05 à

- Le lymphome de Hodgkin à 90%
➤ 82%
□ @U " [Y a Ybd
➤ 5a plus de 80% à sans rechute de la maladie.