

Résultats thérapeutiques du protocole BEACOD dans les stades étendus de la maladie de Hodgkin.

Dr. Lafri ,Dr .Benelhadj, Dr .Chied, Dr. Kebaili ,Dr. Bouabdallah ,Pr.Mezhoud, Pr. Benhalilou ,Pr. Salhi ,Pr Ouchenane Chu Constantine



INTRODUCTION

Le lymphome hodgkinien est une hémopathie maligne du tissu lymphoïde, dont la définition et purement histopathologique .il se caractérise par : la destruction totale ou partielle de l'architecture ganglionnaire, la présence de grande cellules tumorale caractéristiques appelées les cellules de Reed Sternburg localisées au sein d'un tissu inflammatoire réactionnel, souvent accompagné d'un degré plus ou moins marqué de fibrose.

OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

Évaluer le protocole BEACOD dans les stades étendus de la maladie de Hodgkin sur une série de 12 patients.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

De janvier 2021 à décembre 2022(02 ans) , sur 45 patients stade étendus, 12 patients ont reçu une poly-chimiothérapie de type BEACOD. Le diagnostic a été posé par l'analyse anatomopathologique . L'IHC est réalisée dans 100% des cas avec (CD15, CD30) positifs.

Nos patients ont bénéficié d'un bilan d'extension avec examen clinique (un examen ORL en cas d'atteinte cervicale haute), une radiographie du thorax , une TDM TAP, un PET –SCAN initial a été fait chez 02 patients, PET SCAN intermédiaire chez 06 patients et un PET-scan fin traitement chez 8 patients, la PBO si pet scan initial non fait . Les patients sont classés selon la classification d'Ann Arbor ,

RESULTATS

Caractéristiques clinico-biologiques des patients :

AGE (année)	30 (21-50)
SEXE	0,2 (H=2 ; F= 10)
Délai de diagnostic (mois)	6,2 (2-12)
Circonstances de découverte - adénopathie périphérique, - signes généraux	10 (83%) 2 (17%)
TYPE HISTOLOGIQUE - sclero-nodulaire - cellularité mixte	- 11 (91 %) - 1 (8,33%)
STADE - II B E BULKY - III A B - IV A B	- 3 (25%) - 2 (16,66 %) - 1 (8,33%) - 2 (17%) - 4 (33,33 %)
PRONOSTIC - Favorable - défavorable	- 2 (17%) - 10(83 %)

résultats thérapeutiques en fonction du stade :

RÉSULTATS	RG N(%)	RC N (%)	echec
Stades			
. II BE (N: 3)	- 2 (66,6%)	- 2 (66,6%)	- 1 (33,33%)
. III (N :3)	- 3 (100%)	- 3 (100%)	
.IV (N : 6)	- 5 (83,3%)	- 5 (83,3%)	- 1 (16,6 %)

LE DEVENIR DES PATIENTS :

- 01 patient a rechuté après 03 mois/ rémission complète après 2 lignés
- 01 patient refractaire
- 01 PDV

Conclusion

le protocole BEACOD constitue une alternative thérapeutique intéressante, les données suggèrent une efficacité comparable à celle du BEACOPP , tout en offrant un profil de tolérance plus favorable, notamment en matière de préservation de la fertilité et de réduction des complications à long terme.